

～ムコスタ含嗽液の使用法～

①コップ半分程度の水にムコスタ顆粒**1包**を入れ、よく混ぜて溶かして下さい。

②ぐちゅぐちゅとうがいをして口の中全体に行きわたらせ、**そのまま飲み込んで下さい。**

※溶かした分は、1回の使用ですべて使い切して下さい。

※独特の味がします。使用しにくい場合は味付けもできますので薬局までお申し付け下さい。

※一緒に他のお薬を服用してもかまいません。



1日3回 うがい

～ムコスタ含嗽液の使用法～

①コップ半分程度の水にムコスタ顆粒**1包**を入れ、よく混ぜて溶かして下さい。

②ぐちゅぐちゅとうがいをして口の中全体に行きわたらせ、**そのまま飲み込んで下さい。**

※溶かした分は、1回の使用ですべて使い切して下さい。

※独特の味がします。使用しにくい場合は味付けもできますので薬局までお申し付け下さい。

※一緒に他のお薬を服用してもかまいません。



1日3回 うがい

～プロマック含嗽液の使用法～

- ①プロマックD錠**6錠**と水**5mL**を付属の容器に入れ、よく混ぜて溶かして下さい。
- ②そこにアルクレイン(緑色の液体)**100mL**を、加えてよく振って混ぜて下さい。
- ③ぐちゅぐちゅとうがいをして口の中全体に行きわたらせ、そのまま飲み込んで下さい。

※使用前によく振って下さい。

※うがい後は10分位は飲食しないで下さい。

※冷所に保存して下さい。

1日3回 1回5mL



～プロマック含嗽液の使用法～

- ①プロマックD錠**6錠**と水**5mL**を付属の容器に入れ、よく混ぜて溶かして下さい。
- ②そこにアルクレイン(緑色の液体)**100mL**を、加えてよく振って混ぜて下さい。
- ③ぐちゅぐちゅとうがいをして口の中全体に行きわたらせ、そのまま飲み込んで下さい。

※使用前によく振って下さい。

※うがい後は10分位は飲食しないで下さい。

※冷所に保存して下さい。

1日3回 1回5mL



～プロマック含嗽液の使用法～

- ① 使用前によく振って下さい。
- ② ぐちゅぐちゅとうがいをして口の中全体に行きわたらせ、そのまま飲み込んで下さい。
- ③ うがい後は10分程度、飲食をしないで下さい。
- ④ 使用後は、冷所で保管して下さい。

1日3回 1回5mL

※2週間以上たったものは使用しないで下さい。



～プロマック含嗽液の使用法～

- ① 使用前によく振って下さい。
- ② ぐちゅぐちゅとうがいをして口の中全体に行きわたらせ、そのまま飲み込んで下さい。
- ③ うがい後は10分程度、飲食をしないで下さい。
- ④ 使用後は、冷所で保管して下さい。

1日3回 1回5mL

※2週間以上たったものは使用しないで下さい。



「ツムラ138 桔梗湯」の使い方



300mL～500mLの白湯に溶解



①ペットボトルや投薬瓶に1日分(3包)を入れ白湯300～500mLに溶かします。

②口にゆっくりと含み(患部に当たるように)その後、飲み込みます。

③適宜使用し、1日分をその日で飲みきって下さい。

※翌日分は新たに使用時に作って下さい。

「ツムラ138 桔梗湯」の使い方



300mL～500mLの白湯に溶解



①ペットボトルや投薬瓶に1日分(3包)を入れ白湯300～500mLに溶かします。

②口にゆっくりと含み(患部に当たるように)その後、飲み込みます。

③適宜使用し、1日分をその日で飲みきって下さい。

※翌日分は新たに使用時に作って下さい。