



抗がん剤投与時の 下痢止め(ロペラミド)の飲み方

1日3回以上の下痢が始まった場合は、ロペミンの内服を開始してください。
2時間たっても下痢が止まらないときは、さらに1カプセル飲んでください。
それでも下痢が止まらないといは2時間毎に1カプセルずつ飲み続けてください。
なるべく早めに受診して下さい。



抗がん剤投与時の 下痢止め(ロペラミド)の飲み方

1日3回以上の下痢が始まった場合は、ロペミンの内服を開始してください。
2時間たっても下痢が止まらないときは、さらに1カプセル飲んでください。
それでも下痢が止まらないといは2時間毎に1カプセルずつ飲み続けてください。
なるべく早めに受診して下さい。



副作用症状がひどい時、そのほかにも何かいつもと違う症状に気づいた時には、
遠慮なく病院にご連絡下さい。
夜間や土日・祝日は救急外来にて対応します。
高知県立幡多けんみん病院(代表) TEL 0880-66-2222

副作用症状がひどい時、そのほかにも何かいつもと違う症状に気づいた時には、
遠慮なく病院にご連絡下さい。
夜間や土日・祝日は救急外来にて対応します。
高知県立幡多けんみん病院(代表) TEL 0880-66-2222