



# 採血のいろは

採血は病気の診断や病状の把握を行う検査のため、  
血液を採取する医療行為です。  
安全で間違いのない確実な採血を行うために  
以下の点にご協力くださいますようお願いいたします。



**まずは確認!** 該当される方は事前にお申し出下さい。

- 1 採血時気分の悪くなったことがある方
- 2 消毒薬(アルコール)や手袋(ラテックスなど)にアレルギーをお持ちの方
- 3 血液透析中の方
- 4 乳房切除手術を受けられた方
- 5 血液をさらさらにする薬を服用中の方



また、当院での採血では以下をご了承いただいております。



## ご本人確認について

- ご自身でお名前をお願いします。  
※場合によっては生年月日をお伺いする事もあります。



## 採血部位について

- 通常は肘の血管から採血しますが、細い血管の場合は手首や手の甲から採血する場合があります。
- 針を刺しても採血できない場合や、必要な量採血できなかった場合には、再度採血させていただくことがあります。



## 採血量について

- 採取する血液量はできる限り少量となるよう心がけております。

## 採血に伴う合併症について

採血は基本的に安全な手技であり、合併症を起こすことは極めて少なく、また軽症なものが多いとされています。しかしまれに次のような症状が起こると報告されています。

以下のような症状を起こされたことがある方は事前にお申し出下さい。

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●止血困難や皮下出血(青あざ)<br/>採血後血液が止まりにくかったり、青あざになったりする事があります。採まらずにしっかりと5分以上押さえて下さい。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●アレルギー<br/>採血時の消毒薬やスタッフの手袋(ラテックス)などでかゆみ、発疹をはじめとするアレルギー症状が出る場合があります。</li> </ul>                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●神経損傷<br/>採血後も手指に広がる痛みやしびれなどが持続する事があります。このような痛みやしびれが続く場合はお申し出下さい。</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●血管迷走神経反応<br/>採血時や採血前後に、神経が興奮し急激に血圧が下がる事によって、めまいや気分不良、意識消失などの症状を引き起こす事があります。<br/>※別室にて採血をさせていただきます。</li> </ul> |



このほか、ご不明な点などありましたらご遠慮なくお申し出下さい。  
検査結果につきましては、担当医にお尋ねいただきますようお願いいたします。