

高知県感染症発生動向調査（週報）

2023年 第24週 （6月12日～6月18日）


★県内での感染症発生状況

インフルエンザ及び小児科定点把握感染症（上位疾患5疾患）

↑：急増 ↑：増加 →：横ばい ↓：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
新型コロナウイルス感染症	→	3.73	安芸で減少していますが、高知市、須崎、中央西で増加しています。
感染性胃腸炎	↑	3.00	安芸、須崎で減少していますが、幡多、中央東、中央西で急増、県全域で増加しています。
インフルエンザ	→	2.61	中央東、安芸、須崎で急減していますが、中央西で急増、高知市、幡多で増加しています。
ヘルパンギーナ	↓	1.27	幡多、中央西で急減、県全域、須崎で減少していますが、中央東で増加し、高知市では注意報値を超えています。
RSウイルス感染症	→	1.00	幡多で減少していますが、中央西で急増しています。

★地域別感染症発生状況



【感染症予防の基本】

手洗い：感染症予防の基本は手洗いです

- ・爪は短く切っていますか？
- ・指輪・時計ははずしていますか？

- 1) 石けんを泡立て、手のひらをよくこすります
- 2) 手の甲、指の間や指先、ツメの間まで丹念にこすります
- 3) 親指をねじり洗いし、手首も忘れずにあらいます
- 4) 石けんを洗い流し、清潔なタオルで拭き取って乾かします

汚れの残りやすいところも丁寧に：指先、指の間、爪の間、親指の周り、手首、手のしわ
タオルの共有は避けましょう



★県内で注目すべき感染症（注意点や予防方法）

○新型コロナウイルス感染症（COVID-19）


主な症状は発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状であり、頭痛、下痢、味覚障害、嗅覚障害を呈する場合もあります。

感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出される、ウイルスを含む飛沫又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感染者の目や鼻、口に直接的に接触することにより感染します。特に密閉・密集・密接（三密）の空間では感染が拡大するリスクが高くなります。自らの感染を防ぐだけでなく、他人に感染させないように「感染予防の基本」をしっかりと実行しましょう。

新型コロナウイルス感染症（高知県特設サイト）：<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111301/info-COVID-19.html>

●定点医療機関からの報告数

	新規感染者数	定点当たり感染者数
第20週 5/15～5/21	75	1.70
第21週 5/22～5/28	79	1.80
第22週 5/29～6/4	108	2.45
第23週 6/5～6/11	153	3.48
第24週 6/12～6/18	164	3.73



・新型コロナウイルス感染症定点医療機関数：44

・新型コロナウイルス感染症の届出基準：発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状を有する者について分離・同定による病原体の検出、病原体遺伝子の検出、抗原定性検査・抗原定量検査による抗原の検出などの検査方法により新型コロナウイルス感染症と診断した場合。

又は発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む）を呈する者であって新型コロナウイルス感染症であることが確定した者と同居している者であり医師が総合的に診断した場合。

●その他の情報

	重症者数 (6/18日時点)	新規 入院者数	入院患者数 (6/18日時点)	検査数	備考
第20週 5/15～5/21	0	6	10	1,936	
第21週 5/22～5/28	2	10	17	2,458	
第22週 5/29～6/4	2	23	30	2,340	
第23週 6/5～6/11	0	25	47	2,387	
第24週 6/12～6/18	0	15	36	2,223	

「検査数」は外来対応医療機関で実施したPCR及び抗原検査数です。

6月19日 17時時点で集計していますので、国の公表数と異なる場合があります。

<予防方法>


- ・手洗い消毒は感染予防に特に有効です。
- ・「三密」の回避と家やオフィスなどの換気を十分にしましょう。

○夏型感染症（ヘルパンギーナ・咽頭結膜熱・手足口病）

夏型感染症は、例年、6月頃から5歳以下の乳幼児を中心に報告数が増えはじめ、7～8月頃にピークとなります。例年の流行期より早いですが、特に咽頭結膜熱の報告数が増加傾向となっており、注意報値を超えている地域もあるので注意してください。

咽頭結膜熱は発熱・咽頭炎及び結膜炎を主症状とするアデノウイルスによる急性の感染症です。潜伏期は5～7日で、症状は発熱、咽頭炎（咽頭発赤、咽頭痛）、結膜炎が三主症状です。例年5月中旬から下旬頃にかけて患者数が増加し始め、7月下旬から8月上旬をピークとする流行が見られる夏期の疾患で、プールを介して流行することが多いことから、「プール熱」とも呼ばれています。

ヘルパンギーナは、経口・接触感染、咳やくしゃみによる飛沫感染で感染します。手足口病やヘルパンギーナの原因ウイルスであるエンテロウイルスは、回復後も便中から検出されることもあるため、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは注意が必要です。



<予防方法>

- ・手洗い・うがいが大切です。流水と石けんでよく手を洗いましょう。
- ・タオル・コップ等の共用、感染者との密接な接触はさけるようにしましょう。
- ・回復後にも2～4週間の長期にわたり便からウイルスが検出されることがあるので、特に、外出後、食事の前、トイレの後の手洗いを徹底しましょう。

【学校感染症】

咽頭結膜熱：学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「主要症状が消失した後2日を経過するまで」と規定される学校感染症（第2種）です。ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるときは、この限りでないと規定されています。

ヘルパンギーナ：学校保健安全法（同法施行規則第19条）では、出席停止期間の基準が「発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身症状が改善すれば登校可能」と規定される学校感染症（第3種）です。ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるときは、この限りでないと規定されています。

○インフルエンザ

インフルエンザ定点医療機関における迅速診断では、インフルエンザ A 型が 89 件、インフルエンザ B 型が 1 件の報告がありました。

学校等における集団発生の報告でも、学級閉鎖、学年閉鎖が続いています。


学校等における集団発生

保健所		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計
休校	第24週	-	-	-	-	-	-	0
	累計	-	-	2	1	-	-	3
学年閉鎖	第24週	-	1	-	-	-	-	1
	累計	3	4	3	2	2	-	14
学級閉鎖	第24週	-	-	1	1	-	-	2
	累計	-	6	32	2	-	2	42

インフルエンザは、例年 12 月頃から報告数が増加し始め、1~2 月頃にピークとなり 5 月の終わりには一桁になりますが、今年は 6 月になっても報告数の多い状態が続いています。

典型的には突然の発熱で始まり、半日以内に 38℃を超える高熱となり、しばしば頭痛や筋肉痛を伴い、発熱は 3 日程度続きます。潜伏期は 18~72 時間程度です。

外出後の手洗いなどの感染予防を心がけ、症状がある方は、咳エチケットに心がけ、早めに医療機関を受診しましょう。また、適度な湿度の保持、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取、人ごみを避けるなどの対策も有効です。感染力は強く、いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡大します。学校等における集団発生の報告でも学年閉鎖、学級閉鎖の報告が続いていますので、保育園や幼稚園、学校や社会福祉施設など集団生活の場では特に注意が必要です。



<予防方法>

インフルエンザの主な感染経路は咳やくしゃみの際に口から発生される小さな水滴（飛沫）による飛沫感染であることから、感染予防のため以下の咳エチケットに心がけてください。

- ・普段から皆が咳エチケットを心がけるとともにくしゃみを他の人に向けて発しないこと。
- ・咳やくしゃみが出るときはできるだけマスクをすること。
- ・手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗うこと。

【学校感染症】

インフルエンザは学校保健安全法（同法施行規則第 19 条）では、出席停止期間の基準が「発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日（幼児にあっては、3 日）を経過するまで」と規定される学校感染症（第 2 種）です。ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでないとして規定されています。

ダニの感染症（SFTS・日本紅斑熱）に注意！

「日本紅斑熱」や「SFTS（重症熱性血小板減少症候群）」は屋外に生息するダニの一種で、比較的大型（吸血前で3～4mm）の「マダニ」が媒介する感染症です。

「マダニに咬まれないこと」がとても重要です。

マダニは、暖かくなる春から秋にかけて活動が活発になります。人も野外での活動が多くなることから、マダニが媒介する感染症のリスクが高まります（全てのマダニが病原体を持っているわけではありません）。また、飼育している動物の健康状態の変化に注意し、動物が体調不良の際には、咬まれたり舐められたりしないように注意してください。必要な場合は動物病院で受診しましょう。また、ペットがマダニに咬まれないようダニ駆除剤を使用することも有効ですので獣医師に相談しましょう。

【マダニに咬まれないために】

- 長袖・長ズボン・長靴などで肌の露出を少なくしましょう。
- マダニに対する虫除け剤（有効成分：ディートあるいはイカリジン）を活用しましょう。
- 地面に直接座ったりしないよう、敷物を使用しましょう。
- 活動後は体や衣服をはたき、帰宅後にはすぐに入浴し、マダニに咬まれていないか確認しましょう。
- 飼っているネコやイヌが外で咬まれることもあります。ブラッシング等をこまめにしてマダニを持ち込まないようにしましょう。

発熱等の症状が出たとき

野山に入ってからしばらくして（数日～数週間程度）発熱等の症状が出た場合や、動物との接触後体に不調を感じたら、医療機関を受診してください。受診の際、発症前に野山に立ち入ったこと（ダニ等に咬まれたこと）、動物との接触状況等を申し出てください。

- 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関する Q&A（厚生労働省）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/sfts_qa.html

- 高知県衛生環境研究所 ダニが媒介する感染症及び注意喚起パンフレット

<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130120/2015111600016.html>

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2類	結 核	1	23	40歳代 男性	幡 多
5類	破傷風	1	1	20歳代 女性	高知市

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
24	ヘルパンギーナ	39℃, 咳嗽	10か月	男	須崎	Adenovirus 2
						Rhinovirus
24	ヘルパンギーナ疑い	40℃	1	女	須崎	Adenovirus 2
24	新型コロナウイルス感染症	38℃, 鼻汁	1	女	須崎	Adenovirus 2
24	不明発疹症	39℃, 発疹	1	男	須崎	Human herpes virus 6
24	インフルエンザ	40℃	14	男	高知市	Influenza virus A H3 NT
24	不明発疹症	38℃, 発疹	2	女	須崎	Rhinovirus

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報
中央東	おひさまこどもクリニック	アデノウイルス扁桃炎 3 例 (1 歳、2 歳、10 歳)
	早明浦病院小児科	アデノウイルス感染症 3 例 (3 歳男 2 人、3 歳女)
	JA 高知病院小児科	マイコプラズマ気管支炎 2 例
	野市中央病院小児科	COVID-19 1 例 (4 歳男)
高知市	けら小児科・アレルギー科	アデノウイルス咽頭炎 9 例 (1 歳 6 人、2 歳 3 人) インフルエンザ A 型 9 例 RS ウイルス気管支炎 1 例 (0 歳)
	福井小児科・内科・循環器科	インフルエンザ A 型 1 例 溶連菌感染症 8 例 インフルエンザ+溶連菌同時感染 1 例 (10 歳男) ヘルパンギーナ 9 例 口唇ヘルペス 2 例 (7 歳女、10 歳男) RS ウイルス感染症 1 例
	ふないキッズクリニック	アデノウイルス咽頭炎 2 例 (1 歳女、2 歳男)
中央西	くぼたこどもクリニック	インフルエンザ A 型 3 例 (25 件中 3 例陽性)
須 崎	もりはた小児科	アデノウイルス咽頭炎 1 例 (10 か月女) ムンプス 2 例 COVID-19 5 例 (7 歳 3 人、10~14 歳 2 人 : 陽性率 21.7%)
幡 多	さたけ小児科	インフルエンザ A 型 3 例 (2~10 歳) RS ウイルス 2 例 (0~3 歳) COVID-19 4 例 (10~14 歳)

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869

※この情報に記載のデータは 2023 年 6 月 19 日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報

疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報(55定点医療機関)

第24週 令和5年6月12日(月)～令和5年6月18日(日)

高知県衛生環境研究所

定点名 (定点数)	保健所 疾病名	高知県						計	前週	全国(23週)	高知県(24週末累計)		全国(23週末累計)
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				R5/1/2～R5/6/18	R5/1/2～R5/6/11	
インフルエンザ COVID-19(4)	インフルエンザ		17	76	15		7	115 (2.61)	98 (2.23)	6,688 (1.36)	5,153 (117.11)	696,524 (141.23)	
	新型コロナウイルス感染症	12	24	66	14	17	31	164 (3.73)	153 (3.48)	25,163 (5.11)	635 (14.43)	95,938 (19.45)	
小児科 (26)	咽頭結核熱		3	10			3	16 (0.62)	14 (0.54)	2,161 (0.69)	100 (3.85)	18,743 (5.96)	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		2	18		2	2	24 (0.92)	19 (0.73)	5,237 (1.67)	244 (9.38)	50,316 (16.01)	
	感染性胃腸炎	3	19	26	2	2	26	78 (3.00)	54 (2.08)	19,696 (6.29)	2,634 (101.31)	411,487 (130.92)	
	水痘			1			1	2 (0.08)	5 (0.19)	397 (0.13)	45 (1.73)	6,099 (1.94)	
	手足口病			1				1 (0.04)	2 (0.08)	2,057 (0.66)	113 (4.35)	11,903 (3.79)	
	伝染性紅斑							()	()	56 (0.02)	11 (0.42)	779 (0.25)	
	突発性発疹			4	1	1	2	8 (0.31)	9 (0.35)	984 (0.31)	164 (6.31)	18,555 (5.90)	
	ヘルパンギーナ	2	2	19	2	1	7	33 (1.27)	50 (1.92)	9,390 (3.00)	445 (17.12)	28,537 (9.08)	
	流行性耳下腺炎					2		2 (0.08)	()	287 (0.09)	11 (0.42)	2,676 (0.85)	
	RSウイルス感染症		1	15	5		5	26 (1.00)	24 (0.92)	8,285 (2.64)	296 (11.38)	56,711 (18.04)	
眼科(3)	急性出血性結膜炎							()	()	15 (0.02)	()	175 (0.25)	
	流行性角結膜炎							()	()	238 (0.34)	4 (1.33)	3,907 (5.63)	
基幹 (8)	細菌性髄膜炎							()	1 (0.13)	10 (0.02)	4 (0.50)	166 (0.35)	
	無菌性髄膜炎							()	()	14 (0.03)	()	221 (0.46)	
	マイコプラズマ肺炎							()	1 (0.13)	28 (0.06)	14 (1.75)	361 (0.75)	
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)							()	()	1 ()	()	10 (0.02)	
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)							()	()	3 (0.01)	6 (0.75)	95 (0.20)	
計 (小児科定点当たり人数)	17 (5.50)	68 (8.60)	236 (20.58)	39 (12.25)	25 (8.25)	84 (13.96)	469 (13.66)			80,710	9,879 (287.81)	1,403,203	
前週 (小児科定点当たり人数)	34 (10.25)	76 (8.34)	169 (15.34)	25 (8.25)	28 (9.25)	98 (16.46)		430 (12.52)					

注 () は定点当たり人数。

高知県感染症情報(55定点医療機関)定点当たり人数

第24週

定点名 (定点数)	保健所 疾病名	安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前週	全国(23週)	高知県(24週末累計)	全国(23週末累計)
											R5/1/2～R5/6/18	R5/1/2～R5/6/11
インフルエンザ COVID-19(4)	インフルエンザ		1.70	5.43	3.75		0.88	2.61	2.23	1.36	117.11	141.23
	新型コロナウイルス感染症	3.00	2.40	4.71	3.50	4.25	3.88	3.73	3.48	5.11	14.43	19.45
小児科 (26)	咽頭結核熱		0.50	1.11			0.60	0.62	0.54	0.69	3.85	5.96
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.33	2.00		1.00	0.40	0.92	0.73	1.67	9.38	16.01
	感染性胃腸炎	1.50	3.17	2.89	1.00	1.00	5.20	3.00	2.08	6.29	101.31	130.92
	水痘			0.11			0.20	0.08	0.19	0.13	1.73	1.94
	手足口病			0.11				0.04	0.08	0.66	4.35	3.79
	伝染性紅斑									0.02	0.42	0.25
	突発性発疹			0.44	0.50	0.50	0.40	0.31	0.35	0.31	6.31	5.90
	ヘルパンギーナ	1.00	0.33	2.11	1.00	0.50	1.40	1.27	1.92	3.00	17.12	9.08
	流行性耳下腺炎					1.00		0.08		0.09	0.42	0.85
	RSウイルス感染症		0.17	1.67	2.50		1.00	1.00	0.92	2.64	11.38	18.04
眼科(3)	急性出血性結膜炎									0.02		0.25
	流行性角結膜炎									0.34	1.33	5.63
基幹 (8)	細菌性髄膜炎								0.13	0.02	0.50	0.35
	無菌性髄膜炎									0.03		0.46
	マイコプラズマ肺炎								0.13	0.06	1.75	0.75
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)											0.02
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)									0.01	0.75	0.20
計 (小児科定点当たり人数)	5.50	8.60	20.58	12.25	8.25	13.96	13.66				287.81	
前週 (小児科定点当たり人数)	10.25	8.34	15.34	8.25	9.25	16.46		12.52				

病別年次報告数推移グラフ(インフルエンザ/COVID-19定点・小児科定点・眼科定点)

高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2023年 第24週)

