

取り組み

K P I 第1階層

K P I 第2階層

目標

(2) 疾病の早期発見・早期治療

○がん検診受診率の向上対策の推進

・がん検診受診率（40～50歳代）
（R4）肺がん59.2%、胃がん41.6%、大腸がん46.6%、子宮頸がん47.4%、乳がん51.7%
→（R9）60%以上
・がん検診の精密検査受診率（地域）
（R2）肺がん90.4%、胃がん91.7%、大腸がん84.6%、子宮頸がん80.0%、乳がん96.6%
→（R9）90%以上
・がん検診の精密検査受診率（地域＋職域）
（R4）肺がん71.4%、胃がん62.0%、大腸がん56.6%、子宮頸がん57.7%、乳がん89.9%
→（R9）90%以上

○特定健診実施率・特定保健指導実施率の向上対策の推進

・特定健診実施率
（R3）53.7% →（R9）70%以上
・特定保健指導実施率
（R3）24.4% →（R9）45%以上

○血管病重症化予防対策の推進（糖尿病性腎症対策）

・HbA1c8.0%以上の割合（NDBデータ）
（R2）1.31%（男性：1.87% 女性：0.82%）
→（R9）1.15%以下
（代替評価指標：40-74歳HbA1c8.0%以上の割合 市町村国保特定健診結果（FKACデータ））
（R4）1.19%（男性：1.69% 女性：0.78%）
・糖尿病性腎症透析予防強化プログラムを実施する市町村数
（R5）11市町村 →（R9）34市町村

○血管病重症化予防対策の推進（循環器病対策）

・20歳以上の喫煙率
（R4）男性：27.0% 女性6.4%
→（R9）男性：20%以下 女性：5%以下
（代替評価指標：40-74歳喫煙率 市町村国保特定健診結果（FKACデータ））
（R4）男性：22.1% 女性：5.5%
・降圧剤の服用者での収縮期血圧140mmHg以上の人の割合
（R2）男性：35.7% 女性：34.2%
→（R9）男女とも30%未満
（代替評価指標：降圧剤の服用者での収縮期血圧140mmHg以上の人の割合 市町村国保特定健診結果（FKACデータ））
（R4）男性：34.4% 女性：33.5%

・がんの年齢調整死亡率（10万人あたり）
（R3）男性：183.96 女性：88.30
→（R9）男性：全国平均値以下
女性：R3と比べて減少
（R3全国 男性：160.00 女性：93.56）

・脳血管疾患の年齢調整死亡率（10万人あたり）
（R3）男性：105.59 女性：55.26
→（R9）男性：全国平均値以下
女性：全国平均値以下
（R3全国 男性：93.74 女性：55.11）

・虚血性心疾患の年齢調整死亡率（10万人あたり）
（R3）男性：82.45 女性：29.56
→（R9）男性：全国平均値以下
女性：全国平均値以下
（R3全国 男性：72.76 女性：29.58）

・糖尿病性腎症による新規透析導入患者数
（R2～R4の平均）
108人→（R9）100人以下

壮年期（40-64歳）男性の死亡率
（R4）426.8
→（R9）全国平均値以下
（R4全国 359.6）

【柱Ⅰ】
健康寿命の延伸に向けた意識醸成
と行動変容の促進

健康寿命の延伸を図る
（R元→R9）

男性 71.63年→73.52年
（男性1.89年以上）
女性 76.32年→77.11年
（女性0.79年以上）