

[illegible]

表2 4月調査における流れ藻、モジャコ採集状況

採集年月	採集期間	流れ藻 視認点数	流れ藻 採集数	流れ藻平均 面積 (㎡)	流れ藻平均 重量 (kg)	モジャコ		視認地点 平均水温	モジャコの平均 サイズ (cm)
						採捕数	平均随伴尾数		
R7.4	4/7 ~ 4/14	16	5	0.8	7.1	522	104	20.4	5.8
R6.4	4/8 ~ 4/12	142	14	0.9	6.7	295	21	20.0	5.3
H26~R5の平均		88	19	1.3	5.3	321	17	19.3	5.3
R5.4	4/4 ~ 4/12	32	6	0.3	13.1	140	23	18.3	6.3
R4.4	4/1 ~ 4/9	66	24	0.5	4.8	71	3	18.2	6.3
R3.4	4/1 ~ 4/6, 4/22	176	19	0.4	5.8	13	1	19.0	8.8
R2.4	4/6 ~ 4/12	52	16	1.1	2.4	459	29	19.2	7.3
H31.4	4/4 ~ 4/12	187	36	3.0	4.2	338	9	20.0	3.3
H30.4	4/4 ~ 4/17	29	9	1.5	3.7	1150	128	20.2	5.3
H29.4	4/5 ~ 4/14	119	38	1.4	7.3	188	5	19.4	6.0
H28.4	4/4 ~ 4/13	47	11	0.9	3.7	216	17	20.2	5.5
H27.4	4/6 ~ 4/19	90	12	1.1	4.5	452	38	19.3	4.5
H26.4	4/7 ~ 4/15	85	14	0.7	-	178	13	19.0	3.8

* H26~R5の平均のうち、流れ藻平均面積、流れ藻平均重量、モジャコ平均付着尾数、視認地点平均水温及びモジャコの平均サイズは加重平均値

表3 4月調査におけるモジャコの体長（尾叉長）組成

年 月	尾 叉 長 (cm) 階 級																			合計 尾数
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	
	1.4	1.9	2.4	2.9	3.4	3.9	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	9.4	9.9	以上	
R7.4	0	0	0	2	22	40	34	41	59	93	90	42	29	31	14	6	4	5	10	522
R6.4	2	9	18	10	26	33	19	36	28	19	22	17	7	8	6	3	8	6	18	295
H26~R5の平均	1	4	14	16	17	20	25	33	39	30	27	18	17	15	10	8	7	5	17	323
R5.4	1	1	2	1	5	9	11	22	18	18	9	4	3	5	3	2	3	1	22	140
R4.4	0	2	2	7	10	10	2	2	0	2	1	1	1	2	3	5	2	5	14	71
R3.4	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	5	13
R2.4	0	0	7	10	16	18	18	14	22	17	36	30	46	48	45	28	30	15	59	459
H31.4	0	21	85	83	67	27	14	5	5	2	6	2	2	4	2	2	5	0	6	338
H30.4	1	1	2	23	30	98	135	212	217	142	103	77	44	41	3	6	2	9	4	1,150
H29.4	2	11	24	16	9	6	6	7	4	10	7	10	14	5	13	9	8	5	22	188
H28.4	0	0	2	1	0	6	26	32	49	40	29	8	8	6	1	2	2	0	4	216
H27.4	0	1	1	2	12	16	27	27	64	58	72	44	42	28	15	12	9	6	16	452
H26.4	3	3	10	14	20	10	12	13	8	6	9	6	11	7	11	9	3	6	17	178

* H26~R5の平均の合計尾数は、各尾叉長階級で尾単位に四捨五入しているため、表2の平均採捕尾数と整合しない。




図1 調査定線と流れ藻視認・採集地点（令和7年4月）

*Noは流れ藻の番号・カッコ内尾数は採捕されたモジャコの尾数




図2 モジャコ尾叉長組成(4月)

* 縦軸の目盛単位が異なりますのでご注意ください。