採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深	コクロディニウム ポリクリコイデス
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)	(m)	(細胞/ml)
立石(別図⑫)	0.0	24.6	33.3	6.0		
採水時間 9:47	5.0	25.0	33.8	5.4	2	0
透明度 6.0 m	10.0	24.9	33.8	5.4		
栄喜奥(別図②)	0.0	23.8	32.0	6.2		
採水時間 9:54	5.0	25.1	33.8	5.1	5	0
透明度 5.5 m	10.0	25.0	33.8	4.7		
青瀬山(別図③)	0.0	25.1	33.2	6.1		
採水時間 10:03	5.0	25.0	33.8	5.3	2	0
透明度 4.0 m	10.0	25.0	33.8	5.0		
一切田(別図⑪)	0.0	24.8	33.2	5.8		
採水時間 10:05	5.0	24.9	33.8	5.3	2	0
透明度 4.5 m	10.0	24.9	33.8	5.0		
弘浦②(別図①)	0.0	24.6	33.1	6.1		
採水時間 10:15	5.0	24.9	33.8	5.1	2	0
透明度 5.0 m	10.0	24.8	33.8	5.0		

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の 「宿毛湾赤潮情報」(URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html)においてもご覧いただけます。