

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深	コクロディニウム ポリクリコイデス
	(m)	(°C)	(psu)	(mg/l)	(m)	(細胞/ml)
<b>立石 (別図⑫)</b>	0.0	21.7	31.6	5.9		
採水時間 10:15	5.0	22.1	34.1	5.8	7	0
透明度 8.0 m	10.0	22.1	34.1	5.8		
<b>栄喜奥 (別図②)</b>	0.0	21.8	33.9	5.6		
採水時間 10:22	5.0	21.9	34.1	5.5	10	0
透明度 6.1 m	10.0	22.0	34.1	5.7		
<b>青瀬山 (別図③)</b>	0.0	21.4	33.5	5.8		
採水時間 10:30	5.0	22.0	34.0	5.5	4	0
透明度 5.4 m	10.0	22.0	34.1	5.4		
<b>一切田 (別図⑪)</b>	0.0	21.4	33.8	5.9		
採水時間 10:37	5.0	22.0	34.0	5.8	5	0
透明度 6.0 m	10.0	21.9	34.1	5.8		
<b>弘浦② (別図①)</b>	0.0	21.2	33.5	5.8		
採水時間 10:49	5.0	22.1	34.1	5.5	10	0
透明度 7.0 m	10.0	22.2	34.1	5.6		

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の  
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。