

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深	コクロディニウム ポリクリコイデス (細胞/ml)
	(m)	(°C)	(psu)	(mg/l)		
立石 (別図⑫)	0.0	18.8	31.2	6.6	5	0
採水時間 10:09	5.0	18.9	34.3	6.3		
透明度 14.0 m	10.0	18.9	34.3	6.3		
栄喜奥 (別図⑫)	0.0	18.4	34.1	6.7	5	0
採水時間 10:18	5.0	18.5	34.4	6.6		
透明度 12.3m以上	10.0	18.5	34.4	6.6		
青瀬山 (別図⑬)	0.0	16.5	31.7	7.2	10	0
採水時間 10:27	5.0	18.7	34.3	6.7		
透明度 14.0 m	10.0	18.3	34.3	6.6		
一切田 (別図⑪)	0.0	—	29.2	6.7	0・2・5・10	0
採水時間 10:35	5.0	—	33.0	6.6		
透明度 4.5 m	10.0	—	33.1	6.6		
弘浦② (別図①)	—	—	—	—	0・2・5・10	0
採水時間 10:54	—	—	—	—		
透明度 13.5 m	—	—	—	—		

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。