

採集地点 採水時間	水深 (m)	水温 (℃)	塩分 (psu)	溶存酸素 (mg/l)	カレニア パピリオナセア	シャトネラ マリナ	プロロセントラム マイカンス	アカシオ サンガイネア
立石 (別図⑫) 採水時間 10:01 透明度 10.5 m	2.0	24.0	34.1	6.5	0.01	0	0	0
栄喜奥 (別図⑫) 採水時間 10:08 透明度 7.5 m	2.0	24.1	34.1	6.3	0	0	0.01	0
青瀬山 (別図⑬) 採水時間 10:13 透明度 8 m	3.0	24.1	34.1	6.5	0	0	0.01	0
一切田 (別図⑪) 採水時間 10:17 透明度 7.5 m	2.0	24.2	33.9	6.3	0	0	0.02	0
弘浦② (別図①) 採水時間 10:30 透明度 6.5 m	2.0	24.2	34.0	6.4	0.03	0	0.01	0
真珠 採水時間 10:42 透明度 9 m	2.0	24.0	34.0	6.6	0	0	0.02	0
田ノ浦 (別図⑧) 採水時間 10:53 透明度 4 m	3.0	24.0	33.9	6.5	0.03	0	0	0.01

注1. 被害が想定される細胞密度・・・不明(近縁種のカレニア ミキモイの場合、注意報:10細胞/ml、警報:500細胞/ml)

注2. 被害が想定される細胞密度・・・注意報:1細胞/ml、警報:10細胞/ml

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL:<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。