

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深	コクロディニウム ポリクリコイデス	アカシオ サンガイネア
	(m)	(°C)	(psu)	(mg/l)	(m)	(細胞/ml)	
立石 (別図⑫) 採水時間 9:49 透明度 6.7 m	0.0 5.0 10.0	26.1 26.1 26.0	33.1 33.3 33.3	5.8 6.1 5.9	5	0	3
栄喜奥 (別図⑫) 採水時間 9:55 透明度 6.7 m	0.0 5.0 10.0	26.5 26.1 26.1	30.0 33.3 33.3	5.3 5.2 5.3	5	0	0
青瀬山 (別図⑬) 採水時間 10:01 透明度 4.5 m	0.0 5.0 10.0	25.9 26.3 26.1	32.3 33.2 33.3	6.0 6.5 5.1	6	0	2
一切田 (別図⑭) 採水時間 10:06 透明度 5.2 m	0.0 5.0 10.0	26.2 26.0 26.1	32.9 33.2 33.3	6.6 6.3 5.7	7	0	1
弘浦② (別図①) 採水時間 10:14 透明度 4.1 m	0.0 5.0 10.0	26.1 26.2 26.1	32.3 33.2 33.3	5.9 6.0 5.4	5	0	2

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。