採集地点	水深	水温	塩分	溶存酸素	クロロフィル極大層	プロロセントラム
採水時間				L	(検鏡海水の水深) 	マイカンス
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)	(m)	(細胞/ml)
立石(別図⑫)	0.0	25.3	33.2	6.7		
採水時間 10:33	5.0	25.2	33.7	6.3	5	0
透明度 8.8 m	10.0	25.0	33.7	5.7		
栄喜奥(別図②)	0.0	24.9	32.7	6.8		
採水時間 10:11	5.0	25.2	33.7	5.6	5	0
透明度 5.5 m	10.0	25.1	33.7	5.2		
青瀬山(別図③)	0.0	24.6	32.2	7.1		
採水時間 10:17	5.0	25.3	33.6	6.8	10	0
透明度 6.5 m	10.0	25.1	33.7	6.1		
一切田(別図⑪)	0.0	24.6	32.6	7.1		
採水時間 10:24	5.0	25.3	33.6	6.5	10	1
透明度 6.8 m	10.0	25.1	33.7	5.8		
弘浦②(別図①)	0.0	25.0	32.9	6.6		
採水時間 10:34	5.0	25.3	33.6	6.2	5	4
透明度 6.9 m	10.0	25.1	33.7	5.3		
田ノ浦(別図⑧)	0.0	25.8	33.3	6.0		
採水時間 10:45	5.0	25.4	33.6	6.2	3	0
透明度 3.5 m	7.0	25.3	33.6	6.1		

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の 「宿毛湾赤潮情報」(URL: http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html)においてもご覧いただけます。