採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深	プロロセントラム マイカンス	アカシオ サングイネア
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)	(m)	(細胞/ml)	
立石(別図⑫)	0.0	27.6	29.1	6.9			
採水時間 9:56	5.0	25.2	33.8	6.5	8	2	0
透明度 6.9 m	10.0	24.1	33.9	5.6			
栄喜奥(別図②)	0.0	28.2	30.5	6.5			
採水時間 10:03	5.0	25.9	33.7	7.1	5	0	0
透明度 6.7 m	10.0	22.7	34.1	6.1			
青瀬山(別図③)	0.0	27.4	33.1	6.7			
採水時間 10:10	5.0	25.5	33.7	6.8	8	0	1
透明度 5.5 m	10.0	23.9	34.0	5.4			
一切田(別図⑪)	0.0	27.9	32.7	6.7			
採水時間 10:20	5.0	25.6	33.8	6.8	5	0	0
透明度 6.1 m	10.0	23.7	34.0	5.7			
弘浦②(別図①)	0.0	28.3	32.8	6.6			
採水時間 10:33	5.0	26.0	33.7	6.8	8	0	0
透明度 6.4 m	10.0	24.0	34.0	5.7			

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の 「宿毛湾赤潮情報」(URL: http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html)においてもご覧いただけます。