

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深	コクロディニウム ポリクリコイデス	プロロセントラム マイカンス	アカシオ サンガイネア
	(m)	(°C)	(psu)	(mg/l)	(m)	(細胞/ml)		
<b>立石 (別図⑫)</b> 採水時間 10:01 透明度 4.8 m	0.0 5.0 10.0	27.0 26.8 26.7	14.6 32.4 32.7	7.6 6.4 6.2	5	0	0	1
<b>栄喜奥 (別図②)</b> 採水時間 10:08 透明度 5.0 m	0.0 5.0 10.0	27.1 26.8 26.4	27.5 32.2 33.0	7.5 6.6 5.8	5	0	0	0
<b>青瀬山 (別図③)</b> 採水時間 10:14 透明度 5.5 m	0.0 5.0 10.0	27.2 26.8 26.2	24.3 32.2 33.2	6.6 6.8 6.0	5	0	0	0
<b>一切田 (別図⑪)</b> 採水時間 10:21 透明度 5.0 m	0.0 5.0 10.0	27.1 26.9 26.7	22.9 31.9 32.6	7.3 6.9 6.4	5	0	1	0
<b>弘浦② (別図①)</b> 採水時間 10:30 透明度 4.4 m	0.0 5.0 10.0	27.0 26.9 26.7	21.8 31.9 32.5	7.1 7.1 6.3	5	0	0	0

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の  
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。