

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深	コクロディニウム ポリクリコイデス	アレキサンドリウム属
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)	(m)	(細胞/ml)	
立石 (別図⑫) 採水時間 9:59 透明度 9.9 m	0.0 5.0 10.0	18.2 17.5 17.2	34.5 34.6 34.6	8.0 8.3 8.9	7	0	0
栄喜奥 (別図②) 採水時間 10:07 透明度 8.0 m	0.0 5.0 10.0	18.0 17.6 17.3	31.8 34.5 34.6	8.1 8.5 8.3	5	0	0
青瀬山 (別図③) 採水時間 10:15 透明度 8.0 m	0.0 5.0 10.0	18.2 17.9 17.2	31.9 34.6 34.6	7.6 8.3 8.9	5	0	1
一切田 (別図⑪) 採水時間 10:21 透明度 7.7 m	0.0 5.0 10.0	18.3 17.6 17.3	34.3 34.6 34.6	8.1 8.3 8.7	7	0	0
弘浦② (別図①) 採水時間 10:31 透明度 8.1 m	0.0 5.0 10.0	17.9 17.6 17.2	34.5 34.5 34.6	7.6 7.9 8.1	10	0	0

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。