

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深 (m)	コクロディニウム ポリクリコイデス (細胞/ml)		
	(m)	(°C)	(psu)	(mg/l)				
立石 (別図⑫) 採水時間 10:04 透明度 9.2m	0.0 5.0 10.0	17.8 17.3 17.1	30.9 34.5 34.5	7.2 6.5 6.5	10	0		
栄喜奥 (別図⑫) 採水時間 10:13 透明度 6.6 m	0.0 5.0 10.0	18.2 17.8 17.3	34.4 34.5 34.6	6.7 7.0 6.0			7	0
青瀬山 (別図⑬) 採水時間 10:18 透明度 4.8 m	0.0 5.0 10.0	18.2 18.0 17.3	34.2 34.5 34.5	6.9 7.2 6.5				
一切田 (別図⑪) 採水時間 10:23 透明度 7.3 m	0.0 5.0 10.0	18.0 17.8 17.3	27.7 34.5 34.5	7.5 6.9 6.4	7	0		
弘浦② (別図①) 採水時間 10:34 透明度 10.1 m	0.0 5.0 10.0	18.2 17.7 17.3	34.3 34.5 34.5	6.7 6.8 6.5			5	0

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。