

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深	コクロディニウム ポリクリコイデス
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)	(m)	(細胞/ml)
<b>立石 (別図⑫)</b>	0.0	18.4	33.2	8.1		
採水時間 10:15	5.0	18.8	34.5	8.1	10	0
透明度 10.6 m	10.0	18.8	34.5	8.2		
<b>栄喜奥 (別図⑫)</b>	0.0	18.8	34.4	7.9		
採水時間 10:23	5.0	18.7	34.5	8.0	10	0
透明度 7.5 m	10.0	18.7	34.5	8.1		
<b>青瀬山 (別図⑬)</b>	0.0	18.7	34.2	8.0		
採水時間 10:29	5.0	18.9	34.5	7.9	10	0
透明度 6.7 m	10.0	18.8	34.5	8.0		
<b>一切田 (別図⑪)</b>	0.0	18.3	34.0	7.5		
採水時間 10:38	5.0	18.7	34.5	7.5	10	0
透明度 8.0 m	10.0	18.7	34.5	7.5		
<b>弘浦② (別図①)</b>	0.0	18.9	34.4	8.0		
採水時間 10:50	5.0	18.9	34.5	8.0	8	0
透明度 9.2 m	10.0	18.8	34.5	7.7		

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の  
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。