

採集地点 採水時間	水深 (m)	水温 (℃)	塩分 (psu)	溶存酸素 (mg/l)	シャトネラ マリナ	アカシオ サンガイネア	プロロセントラム属	アレキサンドリウム属
白簾 (別図④) 採水時間 11:27 透明度 9 m	5.0	26.4	33.2	6.4	0.04	0	0.05	0
立石 (別図⑫) 採水時間 11:19 透明度 8 m	4.0	26.5	33.1	6.2	0	0	0.05	0
青瀬山 (別図③) 採水時間 11:25 透明度 7 m	4.0	26.5	33.1	6.5	0.01	0	0.01	0.08
栄喜奥 (別図②) 採水時間 11:31 透明度 5 m	3.0	27.0	32.5	6.8	0	0.2	0.13	0
一切田 (別図⑪) 採水時間 11:35 透明度 7.5 m	4.0	26.6	33.0	6.5	0	0.01	0.15	0
弘浦② (別図①) 採水時間 11:47 透明度 6 m	4.0	26.5	33.1	5.7	0	0	0.1	0.14
田ノ浦 (別図⑧) 採水時間 11:59 透明度 3 m	3.0	26.5	33.0	5.6	0	0	0.03	0

※被害が想定される赤潮プランクトンの細胞密度

注. シャトネラ マリナ・・・注意報:1細胞/ml、警報:10細胞/ml

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL:<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。