

| 採集地点 採水時間 | 水深 | 水温 | 塩分 | 溶存酸素 | プロロセントラム マイカンス | ゴニオラックス ポリグラマ |
|---------------------------------------------|-----|------|-------|--------|-------------------|------------------|
| | (m) | (°C) | (psu) | (mg/l) | (細胞/ml) | |
| 立石 (別図⑫) 採水時間 10:55 透明度 8.1 m | 8.0 | 26.5 | 33.7 | 6.1 | 0 | 0 |
| 栄喜奥 (別図②) 採水時間 11:06 透明度 4.2m | 4.0 | 27.1 | 33.7 | 6.1 | 0 | 1 |
| 青瀬山 (別図③) 採水時間 11:12 透明度 3.8 m | 5.0 | 26.6 | 33.8 | 5.7 | 0 | 0 |
| 一切田 (別図⑪) 採水時間 11:19 透明度 7.5 m | 8.0 | 26.6 | 33.8 | 6.4 | 0 | 0 |
| 弘浦② (別図①) 採水時間 11:33 透明度 5.3 m | 5.0 | 27.1 | 33.6 | 6.6 | 0 | 0 |
| 田ノ浦 (別図⑧) 採水時間 11:46 透明度 3.9 m | 3.0 | 26.9 | 33.5 | 5.6 | 0 | 0 |

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」([URL: http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html](http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html))においてもご覧いただけます。