

| 採集地点 採水時間 | 水深 | 水温 | 塩分 | 溶存酸素 | 採水水深 | コクロディニウム ポリクリコイデス (細胞/ml) |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|---------------------------------|
| | (m) | (℃) | (psu) | (mg/l) | (m) | |
| 立石 (別図⑫) 採水時間 11:27 透明度 6.8 m | 0.0 5.0 10.0 | 26.6 26.3 26.2 | 32.6 33.3 33.3 | 6.1 5.7 5.8 | 5 | 0 |
| 栄喜奥 (別図②) 採水時間 12:16 透明度 5.0 m | 0.0 5.0 10.0 | 26.2 26.5 26.3 | 28.9 33.3 33.3 | 6.9 5.8 5.7 | 5 | 0 |
| 青瀬山 (別図③) 採水時間 12:26 透明度 4.8 m | 0.0 5.0 10.0 | 27.1 26.4 26.3 | 20.6 33.3 33.3 | 6.1 5.9 5.6 | 4 | 0 |
| 一切田 (別図⑪) 採水時間 12:23 透明度 5.1 m | 0.0 5.0 10.0 | 27.1 26.4 26.3 | 26.6 33.2 33.3 | 6.0 5.9 5.7 | 5 | 0 |
| 弘浦② (別図①) 採水時間 11:27 透明度 8.3 m | 0.0 5.0 10.0 | 26.6 26.4 26.3 | 14.6 33.3 33.3 | 6.2 5.4 5.5 | 5 | 0 |

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。